

UPUTE ZA UČENIKE I ČLANOVE OBITELJI

Poštovani učenici i članovi obitelji,

ukoliko ste tijekom boravka na nastavi bili izloženi infekciji COVID 19, prema službenom protokolu odredit će se mjera karantene/samoizolacije za sve učenike vašeg razreda koji su bili na nastavi. Mjera se izriče samo učenicima, a ne i ukućanima.

Osobe koje žive u kućanstvu ili rade s osobom u samoizolaciji, ponašaju „uobičajeno“, odnosno one nisu u samoizolaciji i na njih se mjere ne primjenjuju. Braća, sestre i roditelji mogu slobodno ići u školu, na studij ili na posao.

Bez obzira na to, svi oni trebaju provoditi pojačanu osobnu higijenu i higijenu prostora te ograničiti svoja kretanja i socijalne kontakte tako da njihove radne i druge neodgodive obveze nisu narušene.

Roditelji djeteta u samoizolaciji trebaju o tome obavijestiti djetetovog izabranog liječnika, a protokol je takav da škola pošalje grupni popis djece upućenih u samoizolaciju s njihovim osnovnim podacima školskoj liječnici i odjelu za epidemiologiju.

Mjera se ne odnosi na one učenike koji sukladno preporukama HZJZ-a ne ulaze u kategoriju učenika za samoizolaciju (dio teksta izvučen je na kraju ovog dopisa).

Ukoliko Vaše dijete spada u tu grupu molimo vas da nam to javite (na kraju teksta je moja mail adresa, a možete se javiti i školi).

Ako osoba u samoizolaciji razvije znakove bolesti, javlja se svom izabranom liječniku/nadležnom školskom liječniku ukoliko nije u mjestu prebivališta, koji ga šalje na testiranje. U slučaju da učenik bude pozitivan, sve osobe koje žive s njim podliježu mjeri samoizolacije jer se radi o bliskim kontaktima.

U nadi da sam Vam pomogao srdačno Vas svih pozdravljam. Slobodno me kontaktirajte ovim putem (sandro.kresina@zzjzpgz.hr) te ću u što bržem vremenu pokušati pomoći.

Sandro Kresina, dr. med.
Specijalist školske medicine

U samoizolaciju ne idu:

- ***Asimptomatske cijepljene osobe (14 dana nakon završetka cijepljenja)***
- ***Asimptomatske osobe koje su preboljele COVID-19***

Nakon bliskog kontakta sa zaraznom osobom, osobe koje su dovršile primarno cijepljenje, trebaju se strogo pridržavati epidemioloških preporuka za sprječavanje kapljičnih infekcija slijedećih 14 dana i preporučljivo je da se testiraju brzim testom 5-7 dana nakon bliskog kontakta (ako razviju simptome unutar 14 dana od zadnjeg bliskog kontakta, postupa se kao sa sumnjom na COVID-19).

Od preporuke za testiranje 5-7 dana nakon bliskog kontakta s oboljelim izuzete su samo osobe koje su preboljele COVID-19 unazad šest mjeseci.